

Evaluation de l'Addiction : DSM-5

Mode d'utilisation inadapté d'un produit conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance, cliniquement significative, caractérisé par la présence de deux (ou plus) des manifestations suivantes, à un moment quelconque d'une période continue de douze mois :

1. (Je prends) Le produit ou le comportement est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu
2. (J'ai) Il existe un désir persistant ou (je fais) des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l'utilisation du produit ou le comportement
3. (Je passe) Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir le produit ou réaliser le comportement, utiliser le produit ou récupérer de leurs effets
4. (J'ai des) Craving ou une envie intense de consommer le produit, de faire le comportement
5. (J'ai une) Utilisation répétée du produit ou je répète le comportement (qui conduit) conduisant à l'incapacité de remplir des obligations majeures, au travail, à l'école ou à la maison
6. (Je prends) Utilisation du produit (ou je réalise le comportement) malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets du produit ou les conséquences du comportement
7. Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes sont abandonnées ou réduites à cause de l'utilisation du produit ou du fait du comportement répété
8. (J'utilise de manière) Utilisation répétée (le) du produit ou je répète le comportement dans des situations où cela peut être physiquement dangereux
9. L'utilisation du produit ou le comportement est poursuivie bien que (je) la personne sache avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par cette substance
10. Tolérance, définie par l'un des symptômes suivants :
 - a. (J'ai) besoin de quantités notablement plus fortes du produit ou d'un comportement plus présent pour obtenir une intoxication ou l'effet désiré
 - b. (L') effet notablement diminué en cas d'utilisation continue d'une même quantité du produit, ou du même niveau de comportement
11. Sevrage, caractérisé par l'une ou l'autre des manifestations suivantes :
 - a. syndrome de sevrage du produit caractérisé (tremblement, irritabilité, anxiété, dépression....)
 - b. le produit (ou une substance proche) soulage ou évite les symptômes de sevrage.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">•Présence de 2 à 3 critères : ADDICTION LÉGÈRE•Présence de 4 à 5critères : ADDICTION MODÉRÉE•Présence de 6 critères ou plus : ADDICTION SÉVÈRE |
|--|